新潟県朝日池における純度の高いオニビシ群落

渡辺 朝一*

Tomokazu Watanabe : Dominant community of *Trapa natans*
at Lake Asahiike in Niigata Prefecture

ヒシ属 *Trapa* は、旧世界に広く分布する浮葉植物である。日本列島には、ヒシ *Trapa japonica*、オニビシ *T. natans*、ヒメビシ *T. bispinosa* の3種が分布するとされている（角野，1994）。しかし、種類の主要な識別点となる果実の形態に変化が多く、その原因や種類の分類が明確になっているわけではない。小型の果実をつけるヒメビシは現在稀な種とされているが、中型・大型の果実をつけるヒシ類に関しては、各地の池沼で混在の様子が報告されている（福井・清水，1992；角野，1988；中川，1988）。その中で、大型で4本の棘を持つオニビシが優占する水域は、千葉県印旛沼（小林・岩木，1998）などから報告されているが、地域的偏りがあるようである。筆者は新潟県の高田平野に位置する朝日池において、その南岸にうち寄せられたヒシ属果実の調査を行い、拾得した果実のほとんどが大型で4本の棘を持つオニビシのものであったので、滋賀県で拾得した

ヒシの果実との比較も含めて報告する。

調査地は新潟県上越地区の高田平野に位置する朝日池（37° 15′ N，138° 20′ E）である。朝日池は開水面の面積が約45haで、高田平野に現存する池沼の中で最大であり、多くの水生植物の生育が確認されている（笹川，1990）。調査は、1999年10月23日に行ない、朝日池南岸の岸にうち寄せられたヒシ類の果実を採集した。これらは、カモ類によって葉柄を食べられて茎から離れ、岸辺にうち寄せられたものと思われた。採集後、長径と短径（図1，図2），ならびに湿重量を計測した。同時に1999年9月26日に採集する機会があった、滋賀県琵琶湖畔のしずかの池にて採集した中型2棘のヒシ属果実との比較を行った。

計測の結果を表1に示した。朝日池で採集されたヒシ属果実は大型で4本の棘を持つオニビシがほとんどで、中型で2本の棘を持つヒシの果実も1個採集された。琵琶湖畔のしずかの池で採集さ

図1. ヒシ果実の計測

*〒276-0031 八千代市八千代台北6-2-45-203

図2. オニビシ果実の計測

表1. 朝日池・琵琶湖近傍で採集したヒシ属果実の計測値

		長径 (cm)	短径 (cm)	長径/短径比	湿重 (g)
朝日池由来					
オニビシ	n=77	5.41±0.59	5.30±0.51	1.02	9.01±2.16
ヒシ	n=1	4.90	1.91	2.57	4.10
琵琶湖近傍由来					
ヒシ	n=67	4.08±0.49	1.46±0.24	2.80	3.09±0.69

れたヒシ属果実はすべて中型2棘のヒシであった。オニビシの果実の方が、ヒシのそれより長径で約1 cm以上長く、また、オニビシでは短径も長いために扁平な形をしているヒシ（長径・短径の比が2.80）に対して長径・短径比が1.02と、形状でも明確な差が見られた。また、湿重量でも3倍近く重かった。

笹川（1990）によれば、朝日池はヒシ・オニビシともに記録されているが、少なくとも筆者が調査を行った1999年の秋には、オニビシの優占度が極めて高い状態であった。調査時以外にも、朝日池では岸に漂着したヒシ類の果実を目にする機会が多いが、確認できた範囲ではすべてが大型で4本の棘を持つオニビシであった。現在の朝日池は、オニビシの優占度が極めて高い状態であると推察される。

ヒシ属に関していろいろご指導・ご教示・ご協力をいただいた琵琶湖水鳥湿地センターの清水幸男、琵琶湖研究所の浜端悦治、千葉県立中央博物館の林浩二、新潟県上越市の古川弘の各氏に感謝致します。

引用文献

- 福井順治・清水源, 1992. 静岡県 of ヒシ属果実の形態変異の分析. 水草研究会報 47: 1-5.
- 角野康郎, 1988. ヒシ属における種の問題. 日本の生物 2(12): 21-25.
- 角野康郎, 1994. 日本水草図鑑. 文一総合出版, 東京.
- 小林節子・岩木晃三, 1998. 印旛沼の水草の衰退と水質への影響. 水草研究会報 63: 11-20.
- 中井三従美, 1988. 愛知県知多半島とその周辺 of ヒシ属の果実形態について. 水草研究会報 31: 2-6.
- 笹川通博, 1990. 新潟県平野部の湖沼 of 水生植物. 水草研究会報 41: 6-11.